

1. DUALITÀ DI POINCARÉ (5.6. ABATE-TOUENA)

SIAM  $M$  UNA VARIETÀ DIFFERENZIABILE  
DI DIM.  $m$  ORIENTATA (SENZA BORDO)  
L'APPLICAZIONE LINEARE

$$\int : H^k(M) \rightarrow H_c^{m-k}(M)^* \\ \int [\omega] \mapsto [\int \omega \wedge \tau]$$

(BEN DEFINITA PER IL TEOREMA DI  
STOKES E LE PROPRIETÀ DI  $\wedge$ )

È UN ISOMORFISMO.

LA DIMOSTRAZIONE CONSISTE DI  
VARI PASSAGGI:

• PROPOSIZIONE 5.6.2.  
SIANO  $U, V \subset M$  APERTI. ALLORA  
IL DIAGRAMMA OTTENUTO COMBINANDO  
LA SUCCESSIONE DI MAYER-VIETORIS  
CON LA SUCCESSIONE DI MAYER-VIETORIS  
A SUPPORTO COMPATTO (DUALE) È  
COMPUTATIVO A MENO DEL SEGNO,  
(~~DIR. PARZIALE~~)

• LEMMA DEI CINQUE 5.6.4.  
(SENZA DIM.)

2.

• LEMMA DI POINCARÉ A SUPPORTO

$$\text{COMPATTO} : H_C^k(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} 0 & k \neq n \\ \mathbb{R} & k = n \end{cases}$$

DIT. SOLO DEL CASO ~~MA~~  $n = 1$  (ESEMPIO 5.5.3)

OSS (1) IL RISULTATO PER  $\mathbb{R}^n$

SI OTTIENE DIMOSTRANDO CHE

PER OGNI VARIETÀ  $M$  C'È UN

$$\text{ISOMORFISMO} : H_C^k(M) \rightarrow H_C^{k+1}(M \times \mathbb{R})$$

E POI PER INDUZIONE SU  $M$ .

(2) SU ABATE-TOVENA C'È LA DIT.

NEL CASO GENERALE. NOI DIT.

SOLO NEL CASO  $M$  DI TIPO FINITO E

PROCEDIAMO PER INDUZIONE SUL

NUMEROSI DI APERTI DI UN RICOPRIMENTO

USIAMO QUESTA DEF. DI  
ACICLICO FINITO: RICOPRIMENTO ACICLICO:

$$\text{SE } U_1 \cap \dots \cap U_2 \neq \emptyset \Rightarrow U_1 \cap \dots \cap U_2 \text{ È DIFFEOMORFA A } \mathbb{R}^{\boxed{n}}$$

$$\boxed{S=1} \quad M = U_1 \quad \text{⊗}$$

$n = \dim M$

$U_1$  È DIFFEOMORFO A  $\mathbb{R}^n$  PER IPOTESI.

$$\text{DIT. CHE } \int_{\mathbb{R}^n} : H^0(\mathbb{R}^n) \rightarrow H_C^n(\mathbb{R}^n)^* \text{ È UN}$$

ISOMORFISMO

3.

ESSENDO DOMINIO E COBORDISMO  
SP. VETT. DI DIR.  $\mathbb{1}^{(0)}$  È SUFFICIENTE  
DIR. CHE  $\int_M$  NON È L'APPLICAZIONE

NULLA. SIA  $e: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  UNA FUNZIONE  
 $C^\infty$  A SUPPORTO COMPATTO CON  $\int e dt = 1$   
(LA CLASSE DI COPOLOGIA DI)

ALLORA  $\varepsilon = \frac{e}{\prod_{i=1}^n e(x_i)} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \in A_c^n(\mathbb{R}^n)$   
È UN GENERATORE DELLA COPOLOGIA  
 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ . (VEDI OSS. S.S. 13 ABATE-TOUENNA)

QUINDI  $\int_M: H^0(\mathbb{R}^n) \rightarrow H_c^n(\mathbb{R}^n)^*$   
 $1 \mapsto \int_M \varepsilon = 1 \neq 0$  ✓

ORA SUPPONIAMO VERA LA DUALITÀ  
PER OGNI VARIETÀ DI TIPO FINITO  
CHE ABBA UN RICOPRIMENTO ACICLICO  
FINITO COSTITUITO DA  $\geq 2$  S APERTI.

SIA  $\{U_i\}_{i=1, \dots, s}$  UN RICOPRIMENTO

ACICLICO FINITO DI  $M$

—/—  
[0] SI PUÒ DIR. CHE SE  $M$  DIFFEOMORFA  
A  $\mathbb{R}^n \Rightarrow H_c^k(M) \cong H_c^k(\mathbb{R}^n)$ .  $\triangle$   
DIMOSTRAZIONE È ANALOGA AL  
CASO GIÀ VISTO DI  $H^k(M)$

4

CONSIDERIAMO IL RICOPRIMENTO

$$U = U_1 \cup \dots \cup U_{s-1}$$

$$V = U_s$$

$$U \cap V = M \quad U \cap V = (U_1 \cap U_s) \cup \dots \cup (U_{s-1} \cap U_s)$$

PER L'IPOTESI INDUTTIVA LA  
DUALITÀ VALE PER  $U, V, U \cap V$ .

$\Rightarrow$  VALE PER  $M$  PER IL LEMMA  
DEI CINQUE

E LA PROP. 5.6.2.

✓