

Esercizi di Istituzioni di Geometria

Anno Accademico 2018-2019

Primo modulo.

[1] Si considerino su \mathbb{R} le strutture differenziali indotte dai seguenti atlanti formati da una sola carta:

- (\mathbb{R}, φ_1) , dove $\varphi_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è l'identità;
- (\mathbb{R}, φ_2) , dove $\varphi_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_2(x) = x^3$.

Si indichi con \mathbb{R}_{φ_i} , \mathbb{R} con la struttura differenziabile indotta da φ_i .
Si dimostri che

1. L'identità $\mathbb{R}_{\varphi_1} \rightarrow \mathbb{R}_{\varphi_2}$ non è un diffeomorfismo (quindi le strutture differenziali determinate da (\mathbb{R}, φ_1) e (\mathbb{R}, φ_2) sono distinte).
2. Si esibisca un diffeomorfismo $f: \mathbb{R}_{\varphi_1} \rightarrow \mathbb{R}_{\varphi_2}$. (Si deduca che le strutture differenziali determinate da (\mathbb{R}, φ_1) e (\mathbb{R}, φ_2) sono diffeomorfe).

[2] Si dimostri che la sfera S^n è una varietà differenziabile.

[3] Si dimostri che $\mathbb{R}\mathbb{P}^n$ è una varietà differenziabile.

[4] Si dimostri che $\mathbb{R}\mathbb{P}^1$ è diffeomorfo a S^1 .

[5] Si dimostri che $\mathbb{C}\mathbb{P}^n$ è una varietà differenziabile.

[6] Si dimostri che $\mathbb{C}\mathbb{P}^1$ è diffeomorfo a S^2 .

[7] Si dimostri che $S \subseteq M$ è una sottovarietà e $F: M \rightarrow N$ è una funzione C^∞ , la restrizione di F a S è C^∞ e la restrizione del differenziale di F è il differenziale della restrizione.

[8] Si dimostri che la proiezione $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^n$ è un diffeomorfismo locale.

[9] Si dimostri che $S^n \setminus \{\text{due punti}\}$ è diffeomorfa al cilindro $S^{n-1} \times \mathbb{R}$.

[10] Si dimostri che ogni funzione C^∞ tra due varietà è continua.

[11] Si dimostri la composizione di funzioni C^∞ tra varietà è C^∞ .

[12] Siano M, N varietà differenziabili. Si dimostri che $M \times N$ è una varietà differenziabile; che $M \times N$ e $N \times M$ sono diffeomorfe; le proiezioni sui singoli fattori sono C^∞ ; M è una sottovarietà embedded in $M \times N$.

[13] Si trovi un'immersione esplicita di $(0, 1)$ in S^2 che non è un embedding.

[14] Sia $\mathbb{R}^{2,2}$ lo spazio delle matrici reali 2×2 e

$$A := \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sia inoltre $T_A: \mathbb{R}^{2,2} \rightarrow \mathbb{R}^{2,2}$ la mappa $X \mapsto AX$. Si verifichi che T_A è C^∞ e si trovi

$$T_{A*} \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial x} - \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial z} - \sin \theta \frac{\partial}{\partial t} \right).$$

[15] Si dimostri che l'insieme delle matrici $n \times m$ avente rango j è una sottovarietà dello spazio vettoriale delle matrici $n \times m$.

[16] Si dimostri che TS^1 è diffeomorfo a $S^1 \times \mathbb{R}$.

[17] Si dimostri che \mathbb{R}^3 con il prodotto vettoriale \wedge è un'algebra di Lie. Dati i campi su \mathbb{R}^3

$$X = y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z}, \quad Z = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$$

si verifichi che $\text{Span}_{\mathbb{R}}\{X, Y, Z\}$ con l'usuale bracket di spazi vettoriali definisce un'algebra di Lie isomorfa a (\mathbb{R}^3, \wedge) .

[18] Sia $F: M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà differenziabili e $\pi: E \rightarrow N$ un fibrato vettoriale. Si definisce

$$F^*(E) = \{(p, e) \in M \times E : \pi(e) = F(p)\}.$$

Si dimostri che $F^*(E)$ ha una naturale struttura di fibrato vettoriale su M (detto *fibrato pull-back*).

[19] Sia M una varietà differenziabile, $S \subseteq M$ una sottovarietà e $\pi: E \rightarrow M$ un fibrato vettoriale. Si dimostri che $\pi_S: \pi^{-1}(S) \rightarrow S$ definisce un fibrato vettoriale su S . Si trovino le mappe di cociclo di questo fibrato.

[20] Sia M una varietà differenziabile, $S \subseteq M$ una sottovarietà e $\pi: E \rightarrow M$ un fibrato vettoriale. Si dimostri che l'unione disgiunta degli spazi vettoriali $T_p M / T_p S$, al variare di p in S , ha una naturale struttura di fibrato vettoriale su S . Si trovino le mappe di cociclo di questo fibrato.

[21] Si trovi il flusso dei seguenti campi vettoriali su \mathbb{R}^2 :

$$y \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}, \quad x \frac{\partial}{\partial x} + 3y \frac{\partial}{\partial y}, \quad x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}, \quad y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}.$$

[22] Si dimostri che il gruppo dei diffeomorfismi della palla aperta B agisce transitivamente su B . (*Suggerimento*, si dimostri che dato $p \in M$ si dimostri che l'insieme dei punti q di M per cui esiste un diffeomorfismo φ di B tale che $\varphi(p) = q$ è aperto e chiuso in B).

[23] Si dimostri che ogni curva integrale massimale è iniettiva, periodica, o costante.

[24] Sia $S \subseteq M$ un'ipersuperficie compatta, e $X \in \Gamma(M)$ un campo vettoriale trasverso a S ($X_p \notin T_p S$ per ogni $p \in S$). Si dimostri che esiste un $\epsilon > 0$ tale che il flusso di X si restringe ad un diffeomorfismo fra $(-\epsilon, \epsilon) \times S$ e un intorno di S in M .

[25] Sia $F: M \rightarrow N$ un'applicazione di classe C^∞ fra varietà, $X \in \Gamma(M)$ e $Y \in \Gamma(N)$. Indichiamo con $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow M$ il flusso di X e con $\psi: \mathcal{V} \rightarrow N$ il flusso di Y . Si dimostra che Y è F -riferito a X se e solo se per ogni t risulta in $\psi_t \circ F = F \circ \varphi_t$.

[26] Sia $F: M \rightarrow N$ una sommersione. Si dimostri che per ogni $X \in \Gamma(N)$ esiste un campo vettoriale $Y \in \Gamma(M)$ che è F -riferito a X . Si dimostri che in generale Y non è unico.

[27] Sia $F: M \rightarrow N$ una sommersione suriettiva. Sia $X \in \Gamma(M)$ tale che $F_{*|p}(X_p) = F_{*|q}(X_q)$ per ogni $p, q \in M$ tali che $F(p) = F(q)$. Si dimostri che esiste un unico $Y \in \Gamma(N)$ che è F -riferito a X .

Secondo modulo.

[28] Si dica se l'insieme delle soluzioni del sistema di equazioni

$$x^3 + y^3 + z^3 = 1, \quad z = xy,$$

in \mathbb{R}^3 una varietà differenziabile.

[29] Si trovi un esempio di una varietà M che ammette un sottoinsieme A e una funzione $f \in C^\infty(A)$ che non può essere estesa a una funzione differenziabile definita su tutto M .

[30] Si dimostri che in una varietà differenziabile connessa coppie di punti si collegano con curve C^∞ a tratti.

[31] Dato $\varepsilon > 0$ si costruisca un diffeomorfismo $\psi: [-\varepsilon, 1 + \varepsilon] \rightarrow [-1, 2]$ che sia l'identità su $[0, 1]$.

[32] Sia $F: M \rightarrow N$ un'applicazione liscia con differenziale di rango costante. Si dimostri che

- se F è surgettiva, allora è una sommersione;
- se F è bigettiva, allora è un diffeomorfismo.

[33] Si dimostri che l'insieme delle matrici 2×2 aventi determinante nullo non è una sottovarietà dello spazio vettoriale delle matrici 2×2 .

[34] Data l'applicazione differenziabile $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$(u, v) \mapsto (2v - u^2, 3u, 4u + v^2)$$

e la 2-forma differenziale

$$\omega = ydx \wedge dy - zdz \wedge dx + xdx \wedge dy$$

si calcoli $f^*(\omega)$.

[35] Si dimostri che la 1-forma su \mathbb{R}^3

$$\omega = e^{y^2} dx + 2xye^{y^2} dy - 2zdz.$$

è chiusa. Dire se è anche esatta.

[36] Sia M una varietà differenziabile e $\alpha \in \Omega^r(M)$. Si verifichi che vale la seguente formula

$$\begin{aligned} d\alpha(X_1, \dots, X_{r+1}) &= \sum_{j=1}^{r+1} (-1)^{j+1} X_j \left(\alpha(X_1, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_{r+1}) \right) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j \leq r+1}^{r+1} (-1)^{i+j} \alpha([X_i, X_j], X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_{r+1}) \end{aligned}$$

per ogni X_1, \dots, X_{r+1} in $\Gamma(M)$.

[37] Sia $\pi: M \rightarrow N$ un rivestimento C^∞ tra varietà differenziabili. Si verifichi che $\pi^*: \Omega(N) \rightarrow \Omega(M)$ è iniettiva.

[38] Sia $\pi: M \rightarrow N$ un rivestimento C^∞ il cui gruppo di automorfismi agisca transitivamente sulle fibre (cioè per ogni p, q in M tali che $\pi(p_1) = \pi(p_2)$ esiste un diffeomorfismo $\gamma: M \rightarrow M$ tale che $\pi \circ \gamma = \pi$ e $\gamma(p_1) = p_2$). Si dimostri che una forma differenziale $\omega \in \Omega(M)$ soddisfa $\omega = \pi^*(\eta)$ per una qualche forma $\eta \in \Omega(N)$ se e solo se $\gamma^*(\omega) = \omega$ per ogni automorfismo γ del rivestimento.

[39] Sia M una varietà differenziabile di dimensione n . Provare che il fibrato delle n -forme differenziali è banale se e solo se M è orientabile.

[40] Sia ω una 1-forma differenziale su una varietà differenziabile M e si consideri una funzione ovunque non nulla $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $d(f\omega) = 0$. Provare che $\omega \wedge d\omega = 0$.

[41] Si consideri la 1-forma differenziale su \mathbb{R}^4

$$\alpha = xdy - ydx + zdt - tdz$$

e sia

$$i: S^3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1\} \rightarrow \mathbb{R}^4$$

l'inclusione. Provare che $i^*\alpha$ non si annulla in nessun punto.